

Tavoitteena
tupakoimaton Suomi –
missä olemme 2030?



Kolme suurta polkua

1. Haittojen vähentäminen
 - Nikotiinivalmisteet
 - Tupakkatuotteet
 - Tupakointitapa

Kolme suurta polkua

2. Yhteisölliset toimet


- Savuttomat yhteisöt
- Savuttomat tilanteet



Kolme suurta polkua

3. Poliittiset säädöt
 - Hinta- ja veropolitiikka
 - Saatavuuden säätely
 - Tuotevastuulainsäädäntö


Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978–2006



Suomalaisen aikuisväestön terveystietäminen (AVTK) 1978–2006





Tupakointistatus v. 2006



Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK) 1978–2006




Päivittäin tupakoivien huolestuneisuus tupakoinnin terveyshaitoista, lopettamista haluavien ja lopettamista yrittäneiden osuus (%) 1978–2006



Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK) 1978–2006




Tupakointia kokeilleiden 12-18-vuotiaiden määrä (%) iän ja sukupuolen mukaan vuosina 1977-2007





Lähde: Rimpelä A, Rainio S, Huhtala H, Lavikainen H, Pere L, Rimpelä M. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977-2007. Nuorten terveystapatutkimus 2007. (STM selvityksiä 2007:63)

Päivittäin savukkeita polttavien 14-18-vuotiaiden ikävakioidut osuudet (%) sukupuolen mukaan vuosina 1977-2007.



Lähde: Rimpelä A, Rainio S, Huhtala H, Lavikainen H, Pere L, Rimpelä M. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977-2007. Nuorten terveystapatutkimus 2007. (STM selvityksiä 2007:63)



Kuvio 4. Nuuskaa joskus kokeilleiden 12–18-vuotiaiden osuudet (%) vuosina 1981–2007 iän ja sukupuolen mukaan. Nuorten terveystapatutkimus 2007.



- 1950- Tupakan terveysthaitat
- 1970- Yhteiskunnallinen kontrolli
- 1980- Passiivisen tupakoinnin haitat
- 1990- Tupakoinnin sosiaaliset merkitykset
- 2000- Tupakkatuotteet ja haitat
- 2010- Tupakkatuotteiden saatavuus



Fig. 4. - The four stages of the tobacco epidemic





Figure adapted from Lopez et al.¹⁰⁸.

Tobacco or health in the European Union - past, present and future, European Commission 2004




Suomi Keuhko Ilmaantuvuus: ASR (w), kaikki iät



NORDCAN © Association of the Nordic Cancer Registries (22.1.2009)


Ilmaantuvuus: Suomi Keuhko, miehet



NORDCAN © Association of the Nordic Cancer Registries (22.1.2009)





Ilmaantuvuus: Suomi Keuhko, naiset



NORDCAN © Association of the Nordic Cancer Registries (22.1.2009)








Kuva 8. Ajoneuvosuoritteen ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen suhteellinen kehitys (Liikennejärjestelmätyössä PLJ 2007 tehty laskelma).

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030





Kuva 1. Skenaariolientä.

Ruokamuutos 2030 -raportti, Sitra, 2008



TAULUKKO 4. Kotipalveluiden ja laitoshoidon kustannukset 2002 ja ennuste 2015 ja 2030 nykyisellä mallilla ja dementiahoidon tarpeet huomioon ottavalla mallilla (miljoonaa euroa)

		2002	2015	2030	Kasvu % 2002–2015	Kasvu % 2002–2030
Kotiin annettavat palvelut	Nykymalli	292	361	590	24	102
	Dementian hoidon malli	292	986	1 469	238	404
Laitoshoito	Nykymalli	1 306	1 619	2 643	24	102
	Dementian hoidon malli	1 306	1 942	3 171	49	143
Yhteensä	Nykymalli	1 598	1 980	3 233	24	102
	Dementian hoidon malli	1 598	2 928	4 640	83	190

Oikeus ja kohtuus, Stakes, 2006



Stage 5 2030

- Miesten tupakointi <20 %
- Naisten tupakointi 15 %
- Miesten keuhkosyövät insid. <30
- Naisten keuhkosyövät insid. 10

- Epidemiasta jäljellä n. 20 vuotta.

